

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES
DLP 10-7-65 395135

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ (Tél. 5-17)

(COTE-D'OR, DOUBS, HAUTE-SAONE, JURA, SAONE-ET-LOIRE, TERRITOIRE DE BELFORT)

Régisseur de récoltes de la Protection des Végétaux. 21, route de Seurre - BEAUNE.

C. C. P. : DIJON 3.405-19

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

Supplément n° 1 au Bulletin 58 - Juillet 1965

9 Juillet 1965

VIGNE

Vignoble de BOURGOGNE

MILDIOU

Le relevage terminé, effectuer un traitement, à base de produits cupriques ou organocupriques, avant le 15 Juillet.

L'application doit être faite avec un soin particulier - Poursuivre les rognages.

OIDIUM

Une récruescence d'oïdium est à redouter, il est nécessaire d'ajouter à la bouillie anti-mildiou, un soufre micronisé mouillable.

ACARIOSE - ARAIGNÉES ROUGES

Les redoutables "attaques d'acariose" de ce printemps ont montré la virulence de ce ravageur.

La génération d'été est combattue à l'aide d'acaricide de contact.

Surveiller le vignoble, dès l'apparition des araignées rouges - utiliser un acaricide systémique ou de contact - se référer à la liste des produits homologués.

VIGNOBLE DU JURA :

La note du 5 juillet a indiqué le traitement à effectuer.
Il n'est pas nécessaire de le renouveler.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POMIER ET DU POIRIER.

Poursuivre les traitements dans les vergers contaminés.

OIDIUM

Ajouter un anti-oïdium à la bouillie anti-tavelure et continuer l'erradication des pucsses oïdées.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES. - Renouveler le traitement.

ARAIGNEE ROUGE - Intervenir en cas de nécessité avec un acaricide indiqué dans la liste des produits envoyés aux abonnés en début de l'année.

POMME DE TERRE

MILDIOU

Il est recommandé d'appliquer dès que possible un traitement fongicide sur toutes les cultures n'étant pas susceptibles d'être récoltées à bref délai.

.....P.1.107

CULTURES LEGUMIERES

MOUCHE DE L'OIGNON

Le deuxième vol a débuté - les cultures de poireaux dont le sol ou les plants n'ont pas été désinfectés suivant nos conseils devront être protégés par des pulvérisations à base d'ester phosphorique tous les 10 jours.

TEIGNE DU POIREAU

Le vol est en cours, appliquer un traitement, utiliser de préférence un ester phosphorique.

MILDIOU DE L'OIGNON

Des foyers sont constatés sur Poireaux et les pluies orageuses sont favorables à son extension. Nous conseillons d'ajouter un fongicide (voir note du 9 Juin) à la bouillie précédente.

SEPTORIOSE DU CELERI

Poursuivre les traitements.

ANTHRACNOSE DU HARICOT

La maladie s'est installée dans les cultures - appliquer un traitement avec un organique de synthèse du type Manèbe.

PUCERONS NOIRS DU HARICOT

De fortes colonies sont présentes, la cueillette si elle n'a pas déjà débuté va bientôt commencer. Nous rappelons que le seul produit utilisable 7 jours avant la récolte est le Mevinphos (Phosdrin)

MILDIOU DE LA TOMATE

Effectuer un traitement.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

H. SOULIE

Les Contrôleurs chargés des avertissements Agricoles

Imprimerie de la Station de Bourgogne-Franche-Comté
Le Directeur-Gérant

L. BOUYX